

Od Redakcji



Prof. Andrzej Kwolek

Drodzy Czytelnicy

W bieżącym numerze polecam ciekawą pracę redakcyjną dotyczącą aktualnego problemu etiopatogenezy procesu włóknienia wątroby.

W Polsce od kilkunastu lat, podobnie jak w innych krajach, narasta problem zaburzeń snu i bezsenności u młodych dorosłych, co

dotyka aż 60% osób poniżej 25 roku życia. W ciekawej pracy zrealizowanej wśród 600 studentów I–III roku studiów warszawskich uczelni stwierdzono występowanie takich zaburzeń, istotnie większe u kobiet. Jako jedną z przyczyn wskazano prowadzenie zajęć akademickich do późnych godzin wieczornych.

W grupie 336 ratowników medycznych czynnych zawodowo, pracujących w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego na terenie Polski badano poczucie koherencji zdefiniowane jako względnie stała orientacja, wyznaczająca określony sposób postrzegania świata jako przewidywalnego, sterowalnego oraz wartego wysiłku i zaangażowania. Poczucie koherencji okazało się stałą zmienną osobowościową u ratowników medycznych. Mniej stabilne było poczucie zrozumiałości.

W kolejnej pracy przedstawiono wpływ niepełnosprawności dzieci autystycznych na funkcjonowanie ich rodziców. Wyniki potwierdzają obniżony w stosunku do rodziców dzieci zdrowych poziom funkcjonowania rodziców dzieci autystycznych w dziedzinach: zdrowie ogólne, zdrowie psychiczne, funkcjonowanie społeczne, ograniczenia związane z funkcjonowaniem fizycznym i psychicznym, energia i vitalność.

W pracy z dziedziny podstawowych przeprowadzono porównanie progu pobudliwości czuciowej i ruchowej nerwu pośrodkowego przy pomocy krzywej i/t. Okazało się, że istnieją różnice w zakresie wartości natężenia prądu niezbędnego do wywołania reakcji czuciowej i ruchowej dla impulsów prostokątnych i trójkątnych. Różnice obecne są również w wartościach współczynnika i ilorazu akomodacji, reobazy oraz wartości progowej akomodacji. Autorzy podkreślają, że znajomość metodyki wykonania i sposobu interpretacji krzywej i/t może ułatwić fizjoterapeutom zrozumienie i ocenę wyników uzyskanych za pomocą bardziej precyzyjnych badań elektroneurograficznych.

W pracy kazuistycznej opisano przypadki zapalenia mięśni jako manifestację choroby nowotworowej, co dotyczyło zapalenia skórno-mięśniowego u 74-letniego mężczyzny ze współistniejącym guzem pęcherza moczowego i drobnokomórkowym rakiem płuca oraz dwa przypadki zapalenia wielomięśniowego, w tym u 53-letniego mężczyzny, u którego rozpoznano nowotwór jądra i u 63-letniej kobiety, u której w trakcie obserwacji rozpoznano guz jajnika oraz zespół mielodysplastyczny. U wszystkich chorych obserwowano burzliwy początek choroby, w dwóch przypadkach nasilone bóle mięśniowe i zaburzenia połykania, a ponadto brak reakcji na zastosowane leczenie.

W Nowym Roku 2013 życzymy Czytelnikom, Autorom nadsyłanych prac, Członkom Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej, Współpracownikom z Redakcji i Pracownikom Wydawnictwa UR zdrowia, dużo optymizmu oraz realizacji planów życiowych. Równocześnie pięknie dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Andrzej Kwolek